

LEGUMINOSAS DE ALIMENTACION HUMANA

La superficie sembrada de lentejas fué de 51.000 Ha., lo que supone una disminución del 13,6 por ciento en relación con el año anterior.

La de garbanzos fué de 222.000 Ha., un 3,4 por ciento inferior a la campaña pasada. La de judías grano fué de 89.000 Ha., un 7,3 por ciento inferior al año anterior.

	Superficie sembrada			Producción		
	1967 000 Ha.	Avance 1968 000 Ha.	1968 1967=100	1967 000 Qm.	Avance 1968 000 Qm.	1968 1967=100
Lentejas	59	51	86,4	404	321	79,5
Garbanzos	230	222	96,5	1.486	1.363	91,7
Judías grano	96	89	92,7	1.211	1.194	98,6

La producción de lentejas fué de 321.000 Qm., un 20,5 por ciento inferior al año anterior. La de garbanzos fué de 1.363.000 Qm., un 8,3 por ciento inferior al año anterior. La de judías grano fué de 1.194.000 Qm., que supone un 1,4 por ciento menos que la campaña anterior.

Como puede observarse, existe una tendencia a la disminución tanto en la superficie, como en la producción de leguminosas destinadas a consumo humano.

LEGUMINOSAS PARA PIENSO

La superficie sembrada de algarroba fué de 111.000 Ha., un 9 por ciento menos que el año anterior; la de guisante de 19.000 Ha., equivalente a un 5,5 por ciento más que la campaña anterior; y la de habas puede considerarse equivalente al año anterior.

La de veza fué de 71.000 Ha., un 5,3 por ciento inferior al año anterior y la de yeros de 92.000 Ha. un 2,1 por ciento inferior al año 1967.

	Superficie sembrada			Producción		
	1967 000 Ha.	Avance 1968 000 Ha.	1968 1967=100	1967 000 Qm.	Avance 1968 000 Qm.	1968 1967=100
Algarroba	122	111	91,0	1.010	881	87,2
Guisantes	18	19	105,5	134	136	101,5
Habas	108	110	101,8	1.087	1.237	113,8
Veza	75	71	94,7	538	568	105,6
Yeros	94	92	97,9	703	768	109,2

La producción de algarrobas fué de 881.000 Qm., un 12,8 por ciento inferior a la campaña anterior; la de guisantes de 136.000 Qm., es prácticamente equivalente al año anterior; la de habas de 1.237.000 Qm. es un 13,8 por ciento superior al año anterior; la de veza de 568.000 Qm. es un 5,6 por ciento más que la campaña anterior y la de yeros de 768.000 Qm., un 9,2 por ciento superior al año anterior.

PATATA

Los cultivos de patata en general evolucionaron normalmente en casi toda la Península; la siembra y recolección fué normal en las diferentes variedades.

Las superficies sembradas se mantuvieron bastante estabilizadas y, la producción disminuyó en un -- 1,7 por ciento.

A continuación se reflejan los datos de superficie sembrada y producción, según las distintas épocas de recolección.

	Superficie sembrada			Producción		
	1967 000 Ha.	Avance 1968 000 Ha.	1968 1967=100	1967 000 Qm.	Avance 1968 000 Qm.	1968 1967=100
Patata extratemprana....	11	9	81,8	1.081	990	91,6
Patata temprana	53	54	101,9	6.817	7.130	104,6
Patata media estación ..	150	146	97,3	18.798	18.053	96,1
Patata tardía	166	166	100,0	18.386	18.140	98,7

De los datos de superficie sembrada y producción, se deduce que, aunque ambos han permanecido estabilizados para el conjunto del cultivo, se han producido, en cambio, algunas variaciones al considerar los diferentes tipos estacionales de cultivo; sobre todo en el caso de las variedades extratempranas, en donde a una superficie sembrada del 81,8 por ciento respecto al año 1967, ha correspondido una producción del 91,6 por ciento, lo que indica una producción más elevada por unidad de superficie.

También ha sido superior la producción unitaria en el grupo de variedades tempranas, lo que se debe como en el caso anterior, a unas condiciones climatológicas favorables.

En el gráfico adjunto se representa la serie cronológica de producción de patata, comprendiendo los años 1959-68, en la cual se observa que dicha producción ha permanecido centrada, en general, entre 40 y los 50 millones de Qm., salvo en el año 1963 en que se sobrepasaron los 50 millones de Qm.

