

## PATATA

La superficie sembrada se mantuvo en su totalidad bastante estabilizada y la producción aumentó en un 3 por ciento.

A continuación se reflejan los datos de superficie sembrada y producción, según las distintas épocas de recolección.

	Superficie Sembrada			Producción		
	1968 000 Ha.	Avance 1969 000 Ha.	1969 1968=100	1968 000Qm.	Avance 1969 000 Qm.	1969 1968=100
Patata extratemprana.	9	10	111,1	965	1.046	108,4
Patata temprana .....	57	51	89,5	7.372	5.907	80,1
Patata media estación	150	157	104,7	18.606	19.869	106,8
Patata tardía .....	167	168	100,6	18.514	20.348	109,9
<b>Patata total .....</b>	<b>383</b>	<b>386</b>	<b>100,8</b>	<b>45.457</b>	<b>47.170</b>	<b>103,8</b>

De los datos de superficie sembrada, se deduce que aunque en su totalidad han permanecido bastante estabilizadas para el conjunto del cultivo, se han producido algunas variaciones al considerar los diferentes tipos estacionales del mismo. Sobre todo en la variedad extratemprana que aumentó en un 11,1 por ciento y la temprana que disminuyó en un 10,5 por ciento.

La producción ha aumentado en un 8,4 por ciento en la variedad extratemprana, en un 6,8 por ciento en la de media estación y en un 9,9 por ciento en la tardía, disminuyendo en un -19,9 por ciento la variedad temprana.

En el gráfico adjunto se representa la serie cronológica de producción de patata, comprendiendo los años 1959-1969, en el que se observa que la producción se ha movido durante el decenio en la banda delimitada entre los 40 y 50 millones de Qm., excepto en el año -1963 en que dicha producción superó la cifra tope de 50 millones de Qm.

La producción unitaria ha sido mayor en el grupo de variedades tempranas lo que ha sido debido a condiciones climatológicas favorables.

