

GANADO OVINO

Censo y producción

El Censo de ganado ovino en septiembre de 1974 ha descendido en un 3,9 por 100 con relación a 1973. La reducción corresponde a animales mayores de dos años con un 12,4 por 100. Los animales menores de un año y los de uno a dos años presentan una elevación respectivamente del 6,9 y 22,6 por 100.


La evolución de la población ovina queda recogida en el siguiente cuadro:

CENSO

	SEPTIEMBRE 1973 MILES CABEZAS	SEPTIEMBRE 1974 MILES CABEZAS	1974 1973 = 100
Total cabezas	16.238	15.599	96,1
Animales menores de 1 año.	2.667	2.850	106,9
Animales de 1 a 2 años . . .	2.450	3.004	122,6
Animales mayores de 2 años	11.121	9.745	87,6

En cuanto a la producción de carne de ovino en 1974 ha experimentado un incremento de 8,4 por 100, con relación al año anterior.

PRODUCCION DE CARNES DE OVINO-CANAL EN MILES DE TM.



PRODUCCION DE LANA EN MILES DE TM.



El siguiente cuadro expresa su evolución:

PRODUCCION

	1973	1974	1974 1973 = 100
Producción de carne de ovino (miles de Tm.)	131	142	108,4

LANA

Producción

La producción de lana en 1974 ha experimentado un descenso del 4,6 por 100 en relación con el año anterior. La producción que se refleja en el siguiente cuadro comprende solamente la esquilada procedente del coste anual, sin incluir la lana extraída de las pieles de los animales sacrificados durante el año, que representa una cifra importante.

PRODUCCION DE LANA

CLASE	1973 T.M.	1974 T.M.	1974 1973 = 100
Fina	4.553	4.167	91,5
Entrefina	15.833	15.026	94,9
Basta	4.907	4.924	100,3
Total	25.293	24.117	95,4

LECHE DE OVEJA

Producción

La producción de leche de oveja, deducida la consumida por las crías, ha experimentado una retracción del 7,1 por 100 respecto del año anterior.

PRODUCCION

	1973 MILLONES DE LITROS	1974 MILLONES DE LITROS	1974 1973 = 100
Leche de oveja	196	182	92,9

GANADO PORCINO

Censo y producción

El censo de ganado porcino, de septiembre de 1974, presenta un descenso de 4,8 por 100 respecto al mismo período del año anterior. Este descenso corresponde principalmente a animales menores de seis meses, habiendo aumentado en animales de seis meses a un año en un 5,4 por 100.