Algunas de cal y otras de arena

La ACFM, el organismo asesor de pesquerías del ICES, rebaja en sus recomendaciones las capturas de gallo, pero incrementa las de merluza

Escribe Jorge García



Valentín Trujillo, investigador del IEO y representante español en la ACFM.

Del 6 al 13 de octubre pasado el Comité Asesor para la Gestión de Pesquerías –ACFM, en sus siglas en inglés–, se reunió en la sede de Copenhague del Consejo Internacional para la Exploración del Mar –CIEM–, para formular sus recomendaciones de TACs para el Atlántico Nororiental a la Comisión Europea y a otros organismos internacionales para el próximo año. El investigador **Valentín Trujillo**, del centro de Vigo del Instituto Español de Oceanografía, participó como representante español en las deliberaciones de ese organismo, una responsabilidad a la que accedió recientemente y de manera formal, desde que la científica **Carmela Porteiro** –IEO, Vigo–, fue nombrada delegada española ante el CIEM, una representación de la que también forma parte **Luis Valdés**, director del IEO de Gijón.

Trujillo, un experto en dinámica de poblaciones que trabaja en el área de Pesquerías, explicó a **PESCA INTERNACIONAL** que la ACFM utiliza para elaborar sus recomendaciones –realizadas desde un punto de vista biológico–, los datos que aportan varios grupos internacionales de trabajo sobre especies y áreas de pesca. También señaló que *"la calidad de las evaluaciones está también respaldada por una auditoria externa que realizan científicos independientes y otros expertos del CIEM"*. A las deliberaciones de la ACFM asistieron, en esta ocasión, observadores de la industria pesquera y de organizaciones medioambientalistas, además de directivos del CIEM, el centenario y prestigioso organismo científico de referencia para la Comisión Europea, en materia de gestión pesquera en aguas del Atlántico Noreste.

Las recomendaciones que realiza el CIEM, como se sabe, son algunos de los principales elementos de juicio para que los ministros de pesca de los Estados Miembros adopten la decisión política de asignar los TACs de las especies que captura la flota comunitaria, lo que ocurre en el mes de diciembre.

Trujillo adelantó, entre otros datos, que el TAC del stock Norte de gallo recomendado por el CIEM para 2006, 13.600 toneladas, es un 37 por ciento menos que el TAC adoptado para el 2005, que fue de 21.500 toneladas. El investigador también recordó que los desembarcos registrados de esa especie totalizaron 14.300 toneladas en el año 2004. Este severo recorte de la recomendación para las capturas del próximo año, se ve en alguna medida compensada por un ligero incremento en lo que respecta a la merluza: la recomendación para 2006 es capturar 44.000 toneladas, unas 1.500 más que en 2005, año en que el TAC se fijó en 42.600 toneladas. Los desembarcos de 2004 de esa especie sumaron 47.100 toneladas. La propuesta para el rape es capturar "por debajo" de las 33.900 toneladas en 2006. Hay que señalar que en 2005 el TAC fue de 31.200 toneladas, mientras que los desembarcos controlados de 2004 fueron de 34.900 toneladas.

Otros datos

Entre otros datos comunicados y comentados por **Trujillo**, referidos a las principales especies de interés comercial para la flota comunitaria, figura en lo que respecta al caladero nacional, aguas del Norte de Galicia, del Cantábrico y del Oeste y Norte de Portugal, la recomendación de capturas es cero para merluza, rapes y cigalas. Un criterio parecido propuso la ACFM para la anchoa, que consiste en cerrar esa pesquería durante el primer semestre del próximo año, a la espera de los resultados de las campañas de investigación de primavera.

La recomendación científica para las capturas del stock pelágico de gallineta (*Sebastes mentella*) es de 41.000 toneladas, para aguas de Irminger y zonas adyacentes (incluidas las áreas I y II de NAFO). En este sentido hay que recordar que las capturas registradas en 2004 fueron de 124.000 toneladas y que el TAC propuesto por NEAFC de 2005 fue de 81.000 toneladas, aunque finalmente no fue aceptado.

Para la sardina, la propuesta es un fijar un TAC de 96.000 toneladas. Las capturas de 2004 fueron de 92.000 toneladas y en 2005 no hubo TAC.

Por último y con respecto al jurel, se trata de un stock que está en proceso de redefinición, advirtió **Trujillo**. No obstante, la propuesta para el stock Oeste es un TAC de 150.000 toneladas, de las cuales 20.000 pertenecen al Cantábrico. Para el stock de jurel del Sur de Galicia y Portugal, la recomendación es capturar 25.000 toneladas.

SOMETHING PLEASANT, SOMETHING LESS PLEASANT

In October last, the Advisory Committee for Fisheries Management met at the Copenhaguen headquarters of the International Council for the Exploration of the Seas, to formulate its recommendations for TACs for the Northeast Atlantic, to be presented to the European Commission and other international bodies, for 2006. The researcher, Valentín Trujillo, from the Spanish Institute of Oceanography, took part as a Spanish representative, in the deliberations in this body. Among other data, he explained that the TAC for the north megrim stock, recommended by the ICES, for 2006, is 13,600 tonnes, i.e., 37% of the TAC for 2005, which was set at 21,500 tonnes.

This harsh cutback in the recommendation for these catches is, to an extent, counteracted by a slight increase in terms of hake: the recommendation for 2006 is for 44,000 tonnes, some 1,500 more than in 2005, a year in which the TAC was set at 42,600 tonnes. The proposal for monkfish is to catch "below" the 33,900 tonne mark in 2006. It should be noted that in 2005, the TAC was for 31,200 tonnes.

Other data

As far as the Spanish national grounds are concerned, waters of north Galicia, in the Bay of Biscay and the west and north of Portugal, catch recommendation is zero for hake, monkfish and Norway lobster. A similar criteria was proposed by ACFM for anchovy: to close this fishery for the first six months of 2006, and wait for the results from the research campaigns.

The scientific recommendation for catches of pelagic stock of redfish (Sebastes mentella) is 41,000 tonnes, for Irminger waters and adjacent areas (including NAFO areas I and II). For sardine, the proposal is to set a 96,000 tonne TAC. Catches for 2004 amounted to 92,000 tonnes, and no TAC was assigned for 2005.

Finally, horse mackerel is a stock currently being redefined, Trujillo pointed out. Nevertheless, the proposal for the west stock is for TAC of 150,000 tonnes, 20,000 of which belong to the Bay of Biscay. For the horse mackerel stock in Galicia and Portugal, the recommendation is to catch 25,000 tonnes.