

Cumdeo Blanc



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media-fuerte Densidad alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Rojo en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
------------------------	--

<i>Color nudo</i>	Rojo en la cara dorsal Verde con rayas rojas en la cara ventral
-------------------	--

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula-media en nudos Nula-media en entrenudos
--------------------------------	---

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Pigmentación débil-media
---	--------------------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja-alta entre nervios Media-alta sobre nervios
--------------------------------	---

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio
-------------------------	-------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio abierto-medio superpuesto
--	---------------------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Media-fuerte
--------------------------	--------------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Plano y bordes hacia el envés
--------------------------------------	-------------------------------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media-profunda, con lóbulos entre cerrados y muy superpuestos
---	---


<i>Pigmentación del haz</i>	Media-fuerte
-----------------------------	--------------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media
--	-------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Media-muy alta
---	----------------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo corto-ligeramente más corto con densidad muy baja-baja de pelos tumbados
--	--

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes con ambos lados convexos de longitud corta-media y con relación longitud-anchura pequeña media
------------------------------------	--



Cumdeo Blanc



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Pequeño-medio
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto-muy corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña-mediana
<i>Uniformidad tamaño</i>	Regular-no regular
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil-relativamente fácil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Gusto especial
<i>Formación pepitas</i>	Presentes

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón oscuro/ Marrón rojizo
<i>Relieve superficie</i>	Estrada

Fenología:

Época de desborre: media
Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Rendimiento bajo.

Potencial enológico:

- Vinos poco alcohólicos con una acidez del mosto baja.