

# Flame Seedless



## Ampelografía

### Sumidad:

*Apertura extremidad* Completamente abierta

*Pelos postrados de la extremidad* Pigmentación débil  
Densidad débil

### Pámpano:

*Color entrenudo* Verde con rayas rojas en la cara dorsal  
Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral

*Color entrenudo* Verde con rayas rojas en la cara dorsal  
Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral

*Densidad pelos tumbados* Nula o muy baja en nudos  
Nula o muy baja en entrenudos

### Hoja joven:

*Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales* Media

*Densidad pelos tumbados* Nula o muy baja entre nervios  
Baja sobre nervios

### Hoja adulta:

*Tamaño del limbo* Grande

*Forma del limbo* Pentagonal

*Número de lóbulos* Cinco

*Disposición lóbulos del seno peciolar* Medio-abierto en U

*Hinchazón del haz* Nulo o muy débil-débil

*Perfil en sección transversal* Forma de V

*Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores* Profundidad media con lóbulos entre ligeramente superpuestos y muy superpuestos


*Pigmentación del haz* Fuerte

*Densidad pelos tumbados entre nervios principales* Nula o muy baja


*Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales* Nula o muy baja

*Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo* Pecíolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados

*Forma y longitud de dientes* Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana-grande



# Flame Seedless



## **Racimo:**

*Tamaño* Grande

*Compacidad* Media

*Longitud pedúnculo* Medio

## **Baya:**

*Tamaño* Medio

*Uniformidad tamaño* Uniforme

*Color Epidermis* Roja-roja gris

*Forma de perfil* Elíptica

*Separación pedicelo* Difícil

*Grosor piel* Fina

*Pigmentación pulpa* Ausente o muy débil

*Consistencia pulpa* Ligeramente dura

*Suculencia pulpa* Ligeramente jugosa

*Sabores particulares* Sabor especial

*Formación pepitas* Rudimentarias

## **Sarmiento:**

*Color* Marrón amarillento

*Relieve superficie* Estriada

## **Fenología:**

Época de desborre: media

Época de maduración: precoz

## **Aptitudes agronómicas:**

- Variedad de vigor medio, si se quiere aumentar el rendimiento se utiliza una poda larga. La poda corta también es posible.
- Bayas de sabor neutro.
- Buena respuesta a tratamientos con giberrelinas o por incisión anular a fin de aumentar el tamaño de las bayas.

## **Potencial enológico:**

- Exclusivamente como uva de mesa.
- Cualidades gustativas y organolépticas buenas.