

Garnacha Tintorera

Sinonimias: Alicante Henri Bouschet. Negral.



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación media
Densidad alta

Pámpano:

Color entrenudo Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Color nudo Verde en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula-baja en el nudo
Nula-baja en el entrenudo

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Débil

Densidad pelos tumbados Densa entre nervios
Baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Medio-grande

Forma del limbo Orbicular

Número de lóbulos Tres

Disposición lóbulos del seno peciolar Poco abierto
en V

Hinchazón del haz Débil

Perfil en sección transversal Bordes hacia el envés

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad superficial con lóbulos entre cerrados y ligeramente superpuestos



Pigmentación del haz Ausente o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Media

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo igual al nervio central con densidad baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes con ambos lados convexo-rectilíneos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana



Garnacha Tintorera



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Medio
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Media
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Azul-negra
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Fuerte
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda-ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Amarillo
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: precoz

Época de maduración: media-precoz

Aptitudes agronómicas:

- Variedad de porte erguido, vigor medio, producciones bajas pero regulares en climas secos y elevadas con pluviometrías superiores.
- Poco sensible a la sequía, muy sensible al viento y a las heladas primaverales. Poda corta.
- Poco sensible al oídio y a la podredumbre gris. Muy sensible al mildiu.
- Sensible a las enfermedades de la madera.

Potencial enológico:

- Vino de un color rojo profundo, de graduación moderada, acidez equilibrada, pero carece de finura y elegancia.
- Se ha utilizado en cupajes para aportar color en vinos.
- Con escaso poder antociánico.

