

Mencía



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad nula o muy baja

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula en el nudo Nula en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja entre nervios Nula o muy baja sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Abierto en V
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Nula o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Nula o muy baja
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud media y con relación longitud-anchura mediana



Mencía



Racimo:

Tamaño	Pequeño
Compacidad	Medio-compacto
Longitud pedúnculo	Corto-muy corto

Baya:

Tamaño	Media
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Azul-negra
Forma de perfil	Acuminada
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Media
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda-ligeramente dura
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón
Relieve superficie	Estriada

Fenología:

Época de desborre: brotación precoz

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Variedad de porte erguido, poco productiva.
- Se realiza poda corta.
- Madura bien. Sensible al viento.
- Sensible al mildiu, oídio, excoriosis y botrytis.

Potencial enológico:

- Produce vinos aromáticos, afrutados. Se utiliza para producir rosados, tintos jóvenes con o sin maceración carbónica.
- Presentan problemas para conseguir un equilibrio adecuado entre grado probable y acidez total, la cual evoluciona decreciendo rápidamente.
- No apta para crianza en general, salvo en condiciones climáticas muy favorables y suelos muy propicios.

