

Merseguera

Sinonimias: Exquitsagos, Verdosilla



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación media Densidad media

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en el nudo Nula o muy baja en el entrenudo

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Débil
---	-------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Fuerte
--------------------------------	--------

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Media-grande
-------------------------	--------------

<i>Forma del limbo</i>	Orbicular
------------------------	-----------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Abierto en lira
--	-----------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Plano
--------------------------------------	-------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media con lóbulos superpuestos
---	--


<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
-----------------------------	------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Baja-media
--	------------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula
---	------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Baja
--	------

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud cortos y con relación longitud-anchura pequeña
------------------------------------	---



Merseguera



Racimo:

Tamaño	Pequeño-mediano
Compacidad	Medio-compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

Baya:

Tamaño	Mediana
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Verde-amarilla
Forma de perfil	Esférica
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Fina-media
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón
Relieve superficie	Estriado

Fenología:

Época de desborre: medio

Época de comienzo de envero: media-tardía

Aptitudes agronómicas:

- Planta vigorosa, porte horizontal.
- Fertilidad elevada. Producción media-alta, racimos entre medianos y grandes.
- Muy resistente a sequía, se adapta a terrenos poco fértiles. Permite las podas cortas.
- Es sensible al oídio.

Potencial enológico:

- Vinos poco alcohólicos, color amarillo con tonos grisáceos, ligeramente aromáticos, con tonos herbáceos y de almendra amarga, acidez media, cuerpo muy ligero.
- La vocación de esta variedad son vinos jóvenes ligeros, que se pueden mezclar con Malvasía para obtener más aroma y suavidad. Antiguamente se empleaba para la elaboración de vinos rancios y licorosos.

