

# Servant



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad débil

### Pámpano:



<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color entrenudo</i>	Verde en cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos

### Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy débil entre nervios Nula o muy débil sobre nervios

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Mediano
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Siete-más de siete
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil-media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Bordes hacia el envés
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media con lóbulos cerrados-superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Pecíolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios, y con relación longitud-anchura media-grande



# Servant



## Fenología:

**Época de desborre:** temprana

**Época de maduración:** tardía

## Aptitudes agronómicas:

- Se desarrolla bien en suelos calcáreos, no demasiado secos. Muy productiva.
- A veces es bastante sensible a millerange.
- Tiende a producir una gran cantidad de agraces.
- Resiste bien a la podredumbre gris.

## Potencial enológico:

- Con esta variedad se elaboran vinos blancos relativamente neutros.
- Utilizada también como uva de mesa.
- No se cultiva en España.

## Racimo:

<i>Tamaño</i>	Medio
<i>Compacidad</i>	Medio-compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

## Baya:

<i>Tamaño</i>	Media
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica ancha-Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda-ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa-Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

## Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón amarillento-Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estriada