

PEÓN ARY

Argentina sphyraena (Linnaeus, 1758)



Orden: Salmoniformes - Familia: Argentiniidae

Nombres **FAO**: **es** pez plata
fr petite argentine
en argentine



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)
	CANT Y W	MED	CAN	
mínima	-	-	-	12
comercial	-	-	-	

LONGITUD MÁXIMA: 35 cm

Caracteres más significativos

Pez pequeño y esbelto, con forma de prisma en la parte delantera y más redondeado en la zona posterior. Su talla media oscila entre los 10 y los 20 cm.

Cabeza y rostro alargados. Ojos muy grandes y hocico puntiagudo, más largo o de la misma longitud que el diámetro del ojo. Boca pequeña, que no sobrepasa el borde posterior del ojo, y protractil. Sin dientes en las mandíbulas, pero sí en la lengua.

Posee una única aleta dorsal, con 9-12 radios blandos, que se inserta hacia la mitad del cuerpo. Entre la dorsal y la caudal

existe una pequeña aleta adiposa, sin radios visibles, situada en una posición muy retrasada. Aletas pectorales insertadas en la parte inferior de los flancos; formadas por 12-14 radios blandos. Las aletas pélvicas se encuentran bastante retrasadas, algo por detrás de la dorsal; formadas por 10-11 radios blandos. Opuesta a la aleta adiposa está la aleta anal, que posee 10-15 radios blandos. Aleta caudal escotada.

Especies con caracteres semejantes

Argentina silus (peón de altura)

Nombres Comerciales y Locales

Asturias	escamón
Cataluña	moixó, peix de plata, peix rei
Galicia	pión de altura

Descripción General

La coloración del dorso es verdosa y el resto del cuerpo es plateado, con un brillo nacarado; su vejiga natatoria también es plateada.



Las escamas son cicloideas y caducas. Presenta 50-54 escamas en la línea lateral, la cual no llega a la aleta caudal y está remarcada de negro.

Posee ojos hipertrofiados, característicos de especies profundas. La lengua presenta unos dientes grandes en forma de gancho que le permiten agarrar a las presas. El borde superior del opérculo está recortado.

Posee 7-10 branquias cortas y espaciadas en el primer arco branquial y 6 radios branquiostegos.

Hábitat y comportamiento



Vive en la plataforma continental y se localiza en fondos situados entre los 50 y los 500 m de profundidad; en invierno se desplaza a fondos más superficiales, entre 70-100 m.

Es una especie gregaria, que se reúne en bancos más o menos numerosos.

Se alimenta de organismos bentónicos como poliquetos, moluscos, crustáceos y peces pelágicos (sardina (*Sardina pilchardus*) y capellán (*Trisopterus minutus*)).

Distribución



Esta especie se encuentra en el Atlántico este, desde Noruega hasta el Sahara occidental, incluidos Islandia meridional, las islas Feroe Shetland y el Mediterráneo.

Reproducción

Se reproduce en la plataforma continental. En el Mediterráneo la época de reproducción se produce entre el invierno y la primavera; en el Atlántico ocurre algo más tarde; y en el Cantábrico tiene lugar en marzo y abril.

Las hembras suelen poner entre 2.000 y 3.000 huevos, transparentes y con la superficie lisa.

Huevos y larvas son pelágicos. Los primeros tienen un tiempo de incubación de menos de una semana y los segundos acaban descendiendo a aguas profundas. Pueden llegar a vivir 16 años.

Artes de Pesca

Frecuente como captura accesoria de otras pesquerías de arrastre de fondo (gambas).

Comercialización

Su carne es excelente y se comercializa en fresco, pero también es muy frágil y, por este motivo, no es muy común en los mercados. También se utiliza en la industria alimentaria para la elaboración de harinas. Además, se utiliza para obtener de sus escamas y vejiga la guanina, un pigmento natural que se emplea en la producción de perlas artificiales.

Se desembarca fresca y entera.

