



DORADA

SBG

Sparus aurata (Linnaeus, 1758)



Nombres **FAO**: **es** dorada
fr gilthead seabream
en dorade royale



Talla (cm)	Caladeros			Talla de Maduración Sexual (cm)	
	CANT Y W	MED	CAN	M →	H
mínima	19 (7)	20 (1),(7)	19 (7)		
comercial	-	-	-	20-30	33-40

LONGITUD MÁXIMA: 70 cm

Caracteres más significativos

Cuerpo alargado, alto y comprimido lateralmente, con el perfil de la cabeza marcadamente cortado. El tamaño común oscila entre 20 y 50 cm.

Exhibe una característica banda dorada, orlada de negro, que une los ojos del pez a la altura de la frente y, justo detrás de la cabeza, en la parte superior del opérculo y sobre la línea lateral presenta una gran mancha negra subrayada en rojo hacia la parte inferior. Cabeza relativamente grande. Boca situada en posición inferior, pequeña pero con unos característicos labios de aspecto carnoso que esconden una poderosa dentición: de cuatro a seis incisivos en ambas mandíbulas, seguidos por otros más pequeños que se agrupan en dos hileras de impresionantes molares.

Las mandíbulas son poco extensibles, siendo la superior algo prominente.

La aleta dorsal se caracteriza por tener 11 radios espinosos y de 13 a 14 blandos. Las aletas pélvicas son muy largas y puntiagudas, característica que comparte con la mayoría de los representantes de su familia, y carecen de radios espinosos. La anal tiene 3 espinas y 11-12 radios blandos y la ventral un único radio duro. La aleta caudal conforma una cola ancha, ahorquillada y con el borde posterior ribeteado de negro; el pedúnculo caudal es más bien estrecho.

Especies con caracteres semejantes

Sarpa salpa (salema)

Spondyliosoma cantharus (chopa)


Oblada melanura (oblada)

Nombres Comerciales y Locales

Andalucía	cachucho, dorá
Asturias	adorao, chaparreta (juveniles), dourada, mazote
Baleares	aurada, auradella, auradeta, doracha, doradilla, duradella, mocharra, orada, urada, urade, uradelle
Canarias	chacaronna morena, chacaronna negra, zapata blanca, zapata morisca
Cantabria	chaparreta (juveniles), dourada, mazote
Cataluña	aurada, auradella, auradeta, daurada, doradeta, moixarra, moxarra, orada, oralla, urada
Com. Valenciana	aurada, auradeta, dorá, orada, oraes, oralla, urada
Galicia	dourada, mazote
Murcia	orada
País Vasco	txelba, txelba urraburu, txelba urraburu, urraburu, urre-arrain, urreburu

Descripción General

Cuerpo gris plateado, más oscuro en el dorso, caracterizado por la presencia de una gran mancha negra entre el opérculo y el comienzo de la línea lateral y una pequeña banda de color escarlata en el borde superior del opérculo. Banda dorada flanqueada por dos bandas oscuras situadas entre los dos ojos. Aleta dorsal con una banda negra longitudinal. Puntas de la aleta caudal negras.



Como el resto de espáridos presenta el cuerpo recubierto de grandes escamas cicloideas. Preopérculo desnudo. Línea lateral claramente visible que sigue el perfil dorsal y está cubierta por 73-85 escamas.

Ojos pequeños: la longitud de su diámetro es igual a la mitad de la del hocico.

Hábitat y comportamiento



Especie nectobentónica que vive en zonas cercanas a la costa, normalmente por encima de los 30 m de profundidad, sin embargo en ocasiones puede hallarse más allá de los 100 m. Suele encontrarse

sobre los fondos rocosos, que son sus preferidos, pero también se aventura muy frecuentemente en busca de alimento en fondos arenosos. También puede encontrarse en lagunas litorales o marismas soportando importantes cambios de salinidad.

Especie sedentaria y bastante solitaria, aunque puede encontrarse formando parejas o incluso grupos de individuos no muy numerosos en los lugares donde abunda.

La poderosa dentición de la dorada le permite triturar las conchas y caparazones de los animales de los que se alimenta: sobre todo moluscos y crustáceos, pero tampoco rechaza gusanos, sipuncúlidos o pequeños peces. Puede llegar a convertirse en un auténtico azote de los cultivos de mejillón (*Mytilus galloprovincialis*) y ostra (*Pycnodonta cochlear*).

Distribución



Esta especie se distribuye en todo el Mediterráneo y en el Atlántico, desde las islas Británicas hasta Ghana, en la costa africana.

Reproducción

Se trata de un pez hermafrodita proterándrico. Entre el primer y el segundo año de edad alcanza su primera madurez como macho y a partir de los dos o tres años de vida se convierte en una hembra fértil.


La dorada se reproduce de octubre a diciembre y la puesta se produce entre aguas. La fecundación es externa y los huevos fecundados quedan a merced de las corrientes. El desarrollo lar-

vario es largo y dura entre 40 y 50 días, dependiendo de la temperatura del agua. Los juveniles, como en otros espáridos, se asientan en fondos arenosos muy someros y tienen una especial predilección por las aguas tranquilas y ricas en nutrientes de las lagunas y marismas litorales.

El crecimiento de la dorada es rápido respecto al de otros peces, aunque éste depende tanto de la temperatura del agua como de la disponibilidad de alimento. Puede llegar a medir 20 cm de longitud en el primer año de vida.

Alcanza dimensiones considerables, superando los 70 cm de longitud y los 5 kg de peso, si bien existen datos de doradas que sobrepasan, con mucho, este peso.

Evolución Capturas Españolas



Fuente: FAO

Artes de Pesca

La dorada es muy perseguida por pescadores profesionales. La capturan mediante palangres y, más ocasionalmente, con trasmallo u otras redes de enmalle. Sin embargo, las grandes capturas de dorada se producen puntualmente al arrastre y, sobre todo, con artes de cerco muchas veces fuera de la legalidad (cerca de la costa y a poca profundidad), aprovechando las agregaciones de doradas que se producen durante la época de freza, entre octubre y diciembre.

Es también una especie objetivo de la pesca deportiva, que la captura desde la orilla (*surf casting*) o entre aguas con flotador. En pesca submarina se captura a la espera o al agujero.

Comercialización

Una carne de una textura y un sabor excelentes y un buen tamaño, convierten a la dorada en un pez muy apreciado que alcanza unos precios importantes en los mercados. Pero la bondad gastronómica de este pez garantiza una demanda que la pesca no puede satisfacer por lo que la dorada se cultiva en muchos puntos del litoral español y supone casi la mitad de la producción acuícola española. Los ejemplares cultivados se encuentran actualmente en todos los mercados del país si bien esto no impide la comercialización, a un precio mucho más elevado, de las doradas salvajes.

Se vende generalmente fresca. Se desembarca fresca y entera principalmente aunque una pequeña parte puede ser también congelada.

